

『授業・実習・国試に役立つ！ 看護学生のための重要疾患ドリル 2020』

お詫びと訂正

標記書籍におきまして誤りがございました。以下のとおり訂正いたしますとともに、本書をご愛用いただいている皆様にご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

メヂカルフレンド社 編集部

2020年2月3日

該当箇所	誤	正																
P33 問題 20	⑳僧帽弁狭窄症では、・・・	㉑僧帽弁閉鎖不全症では、・・・																
該当箇所	誤																	
P149 1) 妊娠 高血圧 症候群	<p>(妊娠高血圧症候群の旧定義・臨床分類が掲載されていました)</p> <p>1 □□ 妊娠高血圧症候群とは、妊娠①20 ____ 週以降、分娩後②12 ____ 週まで高血圧がみられる場合、または高血圧に③たんぱく尿 ____ を伴う場合のいずれかで、かつこれらの症状が単なる妊娠の偶発合併症によるものでないもの、とされる。</p> <p>2 □□ 妊娠高血圧症候群の病型分類には、妊娠高血圧、④妊娠高血圧腎症 ____、加重型妊娠高血圧腎症、⑤子癇 ____ がある。</p> <p>表1 妊娠高血圧症候群の重症度の分類</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重症度</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽症</td> <td>●血圧(次のいずれか)・収縮期血圧:140mmHg 以上 160mmHg 未満 拡張期血圧: 90mmHg 以上 110mmHg 未満 ●24 時間尿でたんぱく尿 300mg/日以上、2g/日未満</td> </tr> <tr> <td>重症</td> <td>●血圧(次のいずれか)・収縮期血圧:160mmHg 以上 拡張期血圧:110mmHg 以上 ●24 時間尿でたんぱく尿 2g/日以上</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2 妊娠高血圧症候群の病型分類</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>病型</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>妊娠高血圧腎症</td> <td>妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、かつたんぱく尿を伴うもので分娩後 12 週までに正常に回復する場合</td> </tr> <tr> <td>妊娠高血圧</td> <td>妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、分娩後 12 週までに正常に回復する場合</td> </tr> <tr> <td>加重型妊娠高血圧腎症</td> <td>1. 高血圧が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降たんぱく尿を伴う場合 2. 高血圧とたんぱく尿が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降、いずれかまたは両症状が増悪する場合 3. たんぱく尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降に高血圧が発症する</td> </tr> <tr> <td>子癇</td> <td>妊娠 20 週以降に初めて痙攣発作を起こし、てんかんや二次性痙攣が否定されるもの</td> </tr> </tbody> </table>		重症度	定義	軽症	●血圧(次のいずれか)・収縮期血圧:140mmHg 以上 160mmHg 未満 拡張期血圧: 90mmHg 以上 110mmHg 未満 ●24 時間尿でたんぱく尿 300mg/日以上、2g/日未満	重症	●血圧(次のいずれか)・収縮期血圧:160mmHg 以上 拡張期血圧:110mmHg 以上 ●24 時間尿でたんぱく尿 2g/日以上	病型	定義	妊娠高血圧腎症	妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、かつたんぱく尿を伴うもので分娩後 12 週までに正常に回復する場合	妊娠高血圧	妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、分娩後 12 週までに正常に回復する場合	加重型妊娠高血圧腎症	1. 高血圧が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降たんぱく尿を伴う場合 2. 高血圧とたんぱく尿が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降、いずれかまたは両症状が増悪する場合 3. たんぱく尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降に高血圧が発症する	子癇	妊娠 20 週以降に初めて痙攣発作を起こし、てんかんや二次性痙攣が否定されるもの
重症度	定義																	
軽症	●血圧(次のいずれか)・収縮期血圧:140mmHg 以上 160mmHg 未満 拡張期血圧: 90mmHg 以上 110mmHg 未満 ●24 時間尿でたんぱく尿 300mg/日以上、2g/日未満																	
重症	●血圧(次のいずれか)・収縮期血圧:160mmHg 以上 拡張期血圧:110mmHg 以上 ●24 時間尿でたんぱく尿 2g/日以上																	
病型	定義																	
妊娠高血圧腎症	妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、かつたんぱく尿を伴うもので分娩後 12 週までに正常に回復する場合																	
妊娠高血圧	妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、分娩後 12 週までに正常に回復する場合																	
加重型妊娠高血圧腎症	1. 高血圧が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降たんぱく尿を伴う場合 2. 高血圧とたんぱく尿が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降、いずれかまたは両症状が増悪する場合 3. たんぱく尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降に高血圧が発症する																	
子癇	妊娠 20 週以降に初めて痙攣発作を起こし、てんかんや二次性痙攣が否定されるもの																	

正

(妊娠高血圧症候群の新定義・臨床分類)

- 1 □□ 妊娠高血圧症候群とは、妊娠時に高血圧を認めた場合をいう。  
 2 □□ 妊娠高血圧症候群の病型分類には、妊娠高血圧、①妊娠高血圧腎症\_\_\_\_、加重型妊娠高血圧腎症、②高血圧合併妊娠\_\_\_\_がある。

表1 妊娠高血圧症候群の重症度の分類

重症度	定義
重症	1. すべての病型分類において、収縮期血圧 160mmHg 以上または拡張期血圧 110mmHg 以上の場合 2. 妊娠高血圧腎症・加重型妊娠高血圧腎症において、母体の臓器障害または子宮胎盤機能不全を認める場合

表2 妊娠高血圧症候群の病型分類

病型	定義
妊娠高血圧腎症	妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、かつたんぱく尿、各種臓器障害、子宮胎盤機能不全のいずれかを伴うもので、分娩後 12 週までに正常に回復する場合
妊娠高血圧	妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、分娩後 12 週までに正常に回復する場合で、妊娠高血圧腎症に当てはまらないもの
加重型妊娠高血圧腎症	1. 高血圧が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降にたんぱく尿もしくは各種臓器障害を伴う場合 2. 高血圧とたんぱく尿が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降にいずれかまたは両症状が増悪する場合 3. たんぱく尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降に高血圧が発症する場合 4. 高血圧が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降に子宮胎盤機能不全を伴う場合
高血圧合併妊娠	高血圧が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、加重型妊娠高血圧腎症を発症していない場合。